

WEBINAR VVGN – NVVP

Webinar van de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland en de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie op 17 november 2022.

Datum: 17 november van 10.00-12.00

Kosten: €25,-

Aanmelden: vvgn.nl

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Vereniging voor VerslavingsGeneeskunde Nederland en Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Inschrijving

Voor inschrijving kunt u gebruik maken van het digitale **inschrijfformulier**.

Deelnameprijs voor deze webinar bedraagt € 25 (inclusief btw). Deelname van de Aios Verslavingsgeneeskunde is gratis.

U ontvangt een factuur na ontvangst van het inschrijfformulier. Na betaling ontvangt u een link (uiterlijk 5 dagen voor aanvang).

Annulering

Na inschrijving kan het voorkomen dat u zich toch moet afmelden. Tot 3 weken voor de bijeenkomst is dat geen probleem. Bij afmelding binnen 3 weken voor de bijeenkomst wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij afmelding 1 week voor de training wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.

Programma

09:45 uur
inloop / welkom

10:00 – 11:00 uur
No pain, no gain: is het mogelijk om zonder ontweningsverschijnselen te doorstaan, te switchen van methadon (of oxycodon) naar buprenorfine/naloxon?
Peter Vossenbergh, Verslavingsarts KNMG

Buprenorfine/naloxon kan voorgeschreven worden als onderhoudsmedicatie bij een stoornis in het gebruik van opioïden. Om te kunnen switchen van methadon naar buprenorfine/naloxon, moet volgens het label methadon eerst geminderd worden tot 30-40 milligram, vervolgens gestaakt waarna gewacht wordt totdat er ontweningsverschijnselen optreden voordat gestart kan worden met buprenorphine/naloxon. Zowel methadon als buprenorfine/naloxon worden gebruikt om onder andere ontweningsverschijnselen juist te voorkomen. De zekerheid dat ontwenning zal optreden, kan sommige patiënten er van weerhouden om te switchen. Doseringen van minder dan 60 mg methadon vergroten de kans op bijgebruik. Door gebruik te maken van eigenschappen van buprenorfine, met name de hoge affiniteit voor de mu-opiaatreceptor, is het mogelijk

om zonder veel last voor de patiënt, te switchen van methadon naar buprenorfine/naloxon door in te sluipen met microdoseringen. Er wordt ingegaan op de achtergrond en theorie. Aan de hand van een aantal cases wordt toegelicht hoe dit in de praktijk werkt: bij patiënten die methadon gebruiken, maar ook als opioïden zoals oxycodon gebruikt worden.

11:00 – 11:30 uur
ADHD en middelengebruik

11:30 – 12:00 uur
Verplichte zorg in de verslavingszorg
Coen van Gestel, Geneesheer-directeur bij De Forensische Zorgspecialisten, psychiater

Als verslaving in ernstige mate aanwezig is, kan het nodig zijn verplichte zorg toe te passen. In deze presentatie gaat psychiater en geneesheer-directeur Coen van Gestel in op verschillende dilemma's die te maken hebben met verplichte zorg bij ernstig verslaafde patiënten. Wanneer is verplichte zorg effectief? Is er verschil tussen de verschillende verslavende middelen? Heeft de patiënt 'recht' op tenminste eenmaal een verplichte detox, als het vrijwillig niet lukt? Coen van Gestel zal ingaan op de juridische aspecten, (ethische) dilemma's en inhoudelijke overwegingen ten aanzien van bovenstaande vragen.